

Handleiding Voorafkanstabel

Een voorkans is niet hetzelfde als een risicofactor: een verhoogde voorafkans vergroot de kans op het ontwikkelen van hyperbilirubinemie, een risicofactor verhoogt de neurotoxiciteit van bilirubine

- 1 De voorafkans wordt bepaald door de parteur, aansluitend aan de partus.
- 2 Voldoet de pasgeborene aan één van de omstandigheden uit de voorafkanstabel of is er een sterke verdenking op, dan is er een verhoogde voorafkans.
- 3 Soms zijn direct na de partus niet alle omstandigheden uit de voorafkanstabel uit te sluiten (bloedgroepantagonisme, andere hemolytische aandoening, moeizaam gaan van borstvoeding), dan gelden die omstandigheden niet en is er op dat moment geen verhoogde voorafkans.
- 4 Mocht later in de eerste levensweek dan het 1e moment van bepalen toch een omstandigheid aanwezig blijken te zijn, dan wordt de voorafkans op dat moment verhoogd (voorbeeld: borstvoeding gaat moeizaam).
- 5 Bij een verhoogde voorafkans zijn intensievere controles nodig (zie stroomdiagram).

Negroïde kinderen hebben weliswaar een lagere voorafkans, echter een donkere huidskleur maakt het moeilijker hyperbilirubinemie te onderkennen. Uit de NSCK hyperbilirubinemie registratie blijkt dat niet-westerse allochtone kinderen oververtegenwoordigd te zijn.